

第3章 公害の現況と対策 I 大気

(1) 環境基準

物質	環境上の条件	測定方法	達成期間
二酸化硫黄 (SO ₂)	1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値0.1ppm以下であること	溶液導電率法または紫外線蛍光法	維持され又は原則として5年以内において達成されるよう努めるものとする
一酸化炭素 (CO)	1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること	非分散型赤外分析計を用いる方法	維持され又は早期に達成されるよう努めるものとする
二酸化窒素 (NO ₂)	1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内、またはそれ以下であること	ザルツマン試薬を用いる吸光度法またはオゾンを用いる化学発光法	(1)1時間値の1日平均値が0.06ppmを超える地域にあっては、1時間値の1日平均値0.06ppmが達成されるよう努めるものとし、その達成期間は原則として7年以内とする (2)1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内にある地域にあっては、原則としてこのゾーン内において現状程度の水準を維持し又はこれを大きく上回ることをとらないよう努めるものとする
浮遊粒子状物質 (SPM)	1時間値の1日平均値が0.10mg/m ³ 以下であり、かつ1時間値が0.20mg/m ³ 以下であること	濾過捕集による重量濃度測定方法またはこの方法によって測定された重量濃度と直線的な関係を有する量が得られる光散乱法、圧電天びん法若しくはベータ線吸収法	維持され又は早期に達成されるよう努めるものとする
光化学オキシダント (OX)	1時間値が0.06ppm以下であること	中性ヨウ化カリウム溶液を用いる吸光度法若しくは電量法、紫外線吸収法またはエチレンを用いる化学発光法	維持され又は早期に達成されるよう努めるものとする
微小粒子状物質 (PM _{2.5})	1年平均値が15μg/m ³ 以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m ³ 以下であること	微小粒子状物質による大気の汚染の状況を的確に把握することができる場所において濾過捕集による質量濃度測定方法又はこの方法によって測定された質量濃度と等価な値が得られると認められる自動測定機による方法	維持され又は早期達成に努めるものとする

備考

環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活してはいけない地域または場所については、適用しない。

(2) 汚染物質測定状況

神奈川県では大気測定局として、一般環境大気測定局と自動車排出ガス測定局をそれぞれ一局ずつ鎌倉市内に設置し、大気の汚染状況を常時監視しています。

一般環境大気測定局………住宅地での汚染物質の測定(市庁舎屋上に設置)

自動車排出ガス測定局………幹線道路沿道での汚染物質の測定(鎌倉市岡本に設置)

ア 汚染物質経年変化(年間統計値、1時間値の平均値を記載)

項目		25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
市庁舎屋上	二酸化硫黄(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
	(日平均値の2%除外値)	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004
	二酸化窒素(ppm)	0.012	0.012	0.012	0.011	0.010
	(日平均値の98%値)	0.029	0.026	0.027	0.026	0.024
	浮遊粒子状物質(mg/m ³)	0.023	0.021	0.020	0.020	0.021
	(日平均値の2%除外値)	0.059	0.049	0.042	0.038	0.048
	微小粒子状物質PM2.5(μg/m ³)	11.3	12.7	11.1	9.5	8.2
	(日平均値の98%値)	---	34.3	25.8	22.0	20.7
光化学オキシダント(日)	0	0	0	0	0	

※ 光化学オキシダントは市庁舎屋上で1時間値が0.12ppm以上となった日数です。

項目		25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
鎌倉市岡本	二酸化窒素(ppm)	0.016	0.015	0.015	0.015	0.016
	(日平均値の98%値)	0.034	0.030	0.030	0.029	0.034
	一酸化炭素(ppm)	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4
	(日平均値の2%除外値)	0.7	0.6	0.7	0.6	0.8
	浮遊粒子状物質(mg/m ³)	0.020	0.022	0.020	0.018	0.017
	(日平均値の2%除外値)	0.051	0.058	0.045	0.038	0.039
	微小粒子状物質PM2.5(μg/m ³)	13.6	14.2	13.5	11.1	11.2
	(日平均値の98%値)	---	35.5	28.7	25.2	25.8

イ 29年度二酸化硫黄(SO₂)測定結果(市庁舎屋上)

測定年月	有効測定日数(日)	測定時間数(hour)	1時間値の平均値(ppm)	1時間値の最高値(ppm)	日平均値の最高値(ppm)	日平均値が0.04ppmを超えた日数(日)	1時間値が0.1ppmを超えた時間(hour)	日平均値の2%除外値(ppm)
29年4月	30	712	0.002	0.014	0.003	0	0	0.003
5月	31	733	0.002	0.006	0.003	0	0	0.003
6月	29	710	0.002	0.013	0.004	0	0	0.003
7月	30	733	0.002	0.008	0.004	0	0	0.004
8月	30	730	0.003	0.008	0.004	0	0	0.004
9月	30	713	0.002	0.009	0.004	0	0	0.003
10月	31	736	0.002	0.009	0.004	0	0	0.003
11月	30	710	0.002	0.011	0.004	0	0	0.004
12月	31	735	0.002	0.009	0.003	0	0	0.003
30年1月	30	733	0.002	0.009	0.004	0	0	0.004
2月	27	651	0.002	0.009	0.003	0	0	0.003
3月	30	728	0.001	0.009	0.003	0	0	0.003
年間	359	8624	0.002	0.014	0.004	0	0	0.004

ウ 29年度二酸化窒素(NO₂)測定結果

測定年月	有効測定日数(日)	測定時間数(hour)	1時間値の平均値(ppm)	1時間値の最高値(ppm)	日平均値の最高値(ppm)	日平均値が0.04ppm以上となった日数(日)	日平均値が0.06ppmを超えた日数(日)	日平均値の98%値(ppm)	
市庁舎屋上	29年4月	30	714	0.009	0.036	0.018	0	0	0.015
	5月	31	735	0.009	0.033	0.016	0	0	0.016
	6月	30	715	0.008	0.030	0.015	0	0	0.013
	7月	30	731	0.007	0.035	0.013	0	0	0.011
	8月	29	712	0.008	0.027	0.013	0	0	0.013
	9月	30	716	0.009	0.042	0.020	0	0	0.017
	10月	31	737	0.010	0.033	0.021	0	0	0.019
	11月	30	708	0.015	0.076	0.030	0	0	0.028
	12月	31	738	0.015	0.048	0.030	0	0	0.029
	30年1月	30	734	0.012	0.046	0.027	0	0	0.023
	2月	28	667	0.013	0.041	0.023	0	0	0.022
	3月	31	739	0.008	0.031	0.016	0	0	0.013
	年間	361	8646	0.010	0.076	0.030	0	0	0.024

測定年月	有効測定日数(日)	測定時間数(hour)	1時間値の平均値(ppm)	1時間値の最高値(ppm)	日平均値の最高値(ppm)	日平均値が0.04ppm以上となった日数(日)	日平均値が0.06ppm以上となった日数(日)	日平均値の98%値(ppm)	
鎌倉市岡本	29年4月	30	709	0.011	0.043	0.021	0	0	0.020
	5月	12	305	0.009	0.042	0.016	0	0	0.016
	6月	30	715	0.011	0.039	0.021	0	0	0.021
	7月	30	731	0.010	0.056	0.020	0	0	0.018
	8月	30	722	0.012	0.033	0.020	0	0	0.017
	9月	30	713	0.015	0.050	0.028	0	0	0.024
	10月	31	738	0.016	0.049	0.032	0	0	0.030
	11月	30	712	0.022	0.079	0.036	0	0	0.036
	12月	31	738	0.024	0.057	0.041	0	0	0.040
	30年1月	31	737	0.022	0.061	0.044	0	0	0.034
	2月	28	668	0.021	0.052	0.034	0	0	0.033
	3月	31	738	0.015	0.047	0.029	0	0	0.023
	年間	344	8226	0.016	0.079	0.044	0	0	0.034

エ 29年度浮遊粒子状物質(SPM)測定結果

測定年月	有効測定日数(日)	測定時間数(hour)	1時間値の 平均値 (mg/m ³)	1時間値の 最高値 (mg/m ³)	日平均値の 最高値 (mg/m ³)	1時間値が 0.2mg/m ³ を 超えた時間 (hour)	日平均値が 0.1mg/m ³ を 超えた日数 (日)	日平均値の 2% 除外値 (mg/m ³)	
市庁舎屋上	29年4月	28	690	0.021	0.063	0.035	0	0	0.030
	5月	31	739	0.025	0.073	0.048	0	0	0.036
	6月	30	718	0.025	0.101	0.042	0	0	0.042
	7月	31	740	0.032	0.121	0.056	0	0	0.055
	8月	30	736	0.029	0.078	0.047	0	0	0.043
	9月	30	716	0.029	0.132	0.048	0	0	0.048
	10月	31	740	0.019	0.125	0.049	0	0	0.043
	11月	30	716	0.019	0.062	0.034	0	0	0.027
	12月	31	742	0.013	0.057	0.023	0	0	0.021
	30年1月	31	739	0.013	0.049	0.022	0	0	0.021
	2月	27	656	0.016	0.041	0.025	0	0	0.024
	3月	30	731	0.016	0.064	0.039	0	0	0.037
	年間	360	8663	0.021	0.132	0.056	0	0	0.048

測定年月	有効測定日数(日)	測定時間数(hour)	1時間値の 平均値 (mg/m ³)	1時間値の 最高値 (mg/m ³)	日平均値の 最高値 (mg/m ³)	1時間値が 0.2mg/m ³ を 超えた時間 (hour)	日平均値が 0.1mg/m ³ を 超えた日数 (日)	日平均値の 2%除外値 (mg/m ³)	
鎌倉市岡本	29年4月	28	690	0.017	0.152	0.029	0	0	0.025
	5月	12	307	0.022	0.097	0.043	0	0	0.043
	6月	30	717	0.018	0.058	0.036	0	0	0.033
	7月	31	742	0.022	0.274	0.042	1	0	0.039
	8月	31	741	0.022	0.075	0.037	0	0	0.036
	9月	30	718	0.018	0.210	0.040	1	0	0.029
	10月	31	742	0.016	0.260	0.051	1	0	0.040
	11月	30	715	0.017	0.131	0.042	0	0	0.030
	12月	31	741	0.012	0.063	0.024	0	0	0.022
	30年1月	31	742	0.011	0.048	0.023	0	0	0.020
	2月	28	670	0.014	0.063	0.029	0	0	0.023
	3月	31	742	0.016	0.126	0.039	0	0	0.039
	年間	344	8267	0.017	0.274	0.051	3	0	0.039

オ 29年度微小粒子状物質(PM2.5)測定結果

測定年月	有効測定 日数(日)	測定時間 数(hour)	1時間値の 平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	1時間値の 最高値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	日平均値の 最高値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を 超えた日数 (日)	日平均値 の98%値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
市庁舎屋上	29年4月	30	717	9.0	24.0	15.0	0	14.9
	5月	29	709	10.1	38.0	19.5	0	18.9
	6月	30	716	8.6	27.0	16.5	0	16.2
	7月	31	739	9.5	34.0	21.5	0	20.5
	8月	30	734	9.1	33.0	19.7	0	17.1
	9月	30	718	7.7	34.0	18.6	0	14.9
	10月	31	742	6.2	35.0	23.5	0	21.9
	11月	30	716	8.8	34.0	18.8	0	16.1
	12月	31	738	6.6	36.0	16.0	0	14.7
	30年1月	30	731	5.8	48.0	12.0	0	11.7
	2月	28	669	7.9	35.0	20.7	0	15.6
	3月	31	742	9.6	44.0	28.3	0	25.5
	年間	361	8671	8.2	48.0	28.3	0	20.7

測定年月	有効測定 日数(日)	測定時間 数(hour)	1時間値の 平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	1時間値の 最高値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	日平均値の 最高値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を 超えた日数 (日)	日平均値 の98%値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
鎌倉市岡本	29年4月	30	714	11.6	48.0	19.1	0	18.0
	5月	12	303	13.1	58.0	27.4	0	27.4
	6月	28	693	11.3	59.0	21.1	0	19.7
	7月	31	740	11.9	85.0	25.8	0	25.4
	8月	31	738	11.2	61.0	24.2	0	23.2
	9月	30	717	10.3	51.0	21.8	0	20.4
	10月	31	741	9.8	71.0	30.5	0	29.6
	11月	30	718	12.6	55.0	23.7	0	21.9
	12月	31	742	9.9	48.0	21.8	0	19.4
	30年1月	31	741	9.4	38.0	17.9	0	17.5
	2月	28	669	11.7	52.0	23.7	0	21.1
	3月	31	740	12.7	67.0	33.4	0	33.2
	年間	344	8256	11.2	85.0	33.4	0	25.8

カ 29年度一酸化炭素(CO)測定結果(鎌倉市岡本)

測定年月	有効測定日数(日)	測定時間数(hour)	1時間値の平均値(ppm)	1時間値の最高値(ppm)	日平均値の最高値(ppm)	日平均値が10ppmを超えた日数(日)	8時間値が20ppmを超えた回数(回)	日平均値の2%除外値(ppm)
29年4月	30	712	0.3	0.7	0.4	0	0	0.4
5月	12	306	0.3	0.6	0.3	0	0	0.3
6月	30	716	0.4	1.3	0.5	0	0	0.5
7月	31	740	0.3	1.3	0.5	0	0	0.4
8月	31	737	0.4	1.1	0.5	0	0	0.5
9月	30	715	0.4	1.2	0.6	0	0	0.5
10月	31	740	0.4	1.3	0.7	0	0	0.6
11月	30	715	0.5	1.6	0.8	0	0	0.8
12月	31	739	0.6	2.2	1.0	0	0	1.0
30年1月	31	739	0.5	2.0	1.0	0	0	0.8
2月	27	653	0.5	1.7	0.8	0	0	0.7
3月	30	727	0.5	1.3	0.7	0	0	0.7
年間	344	8239	0.4	2.2	1.0	0	0	0.8

キ 29年度光化学オキシダント(OX)測定結果(市庁舎屋上)

測定年月	有効測定日数(日)	測定時間数(hour)	1時間値の平均値(ppm)	1時間値の最高値(ppm)	1時間値が0.06ppmを超えた日数・時間		1時間値が0.12ppm以上の日数・時間		日平均値の最高値(ppm)
					(日)	(hour)	(日)	(hour)	
29年4月	30	716	0.043	0.082	10	68	0	0	0.060
5月	31	736	0.042	0.101	12	75	0	0	0.056
6月	30	716	0.039	0.100	12	58	0	0	0.053
7月	31	737	0.024	0.098	8	35	0	0	0.050
8月	30	731	0.025	0.118	8	46	0	0	0.050
9月	30	710	0.032	0.099	9	38	0	0	0.050
10月	31	738	0.029	0.089	2	10	0	0	0.047
11月	29	706	0.023	0.059	0	0	0	0	0.041
12月	31	740	0.020	0.047	0	0	0	0	0.039
30年1月	31	736	0.025	0.045	0	0	0	0	0.038
2月	28	668	0.030	0.060	0	0	0	0	0.039
3月	30	734	0.040	0.100	7	56	0	0	0.054
年間	362	8668	0.031	0.118	68	386	0	0	0.060

ク 29年度昼間(5時～20時)の光化学オキシダント(OX)測定結果(市庁舎屋上)

測定年月	有効測定日数(日)	測定時間数(hour)	1時間値の平均値(ppm)	1時間値の最高値(ppm)	1時間値が0.06ppmを超えた日数・時間		1時間値が0.12ppm以上の日数・時間	
					(日)	(hour)	(日)	(hour)
29年4月	30	446	0.045	0.082	10	45	0	0
5月	31	458	0.046	0.101	12	62	0	0
6月	30	446	0.043	0.100	12	55	0	0
7月	31	458	0.027	0.098	8	33	0	0
8月	31	452	0.030	0.118	8	45	0	0
9月	30	443	0.036	0.099	9	35	0	0
10月	31	459	0.031	0.089	2	10	0	0
11月	30	437	0.026	0.059	0	0	0	0
12月	31	461	0.022	0.047	0	0	0	0
30年1月	31	458	0.027	0.045	0	0	0	0
2月	28	416	0.032	0.060	0	0	0	0
3月	31	455	0.042	0.100	7	48	0	0
年間	365	5389	0.034	0.118	68	333	0	0

(3) 光化学スモッグの発生状況

注意報発令件数及び被害者数の推移

項目		25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
発令日数	県全体	16	9	10	6	8
	湘南地域	10	3	3	3	4
	本市	0	0	0	0	0
被害者数	県全体	75	0	0	0	0
	湘南地域	0	0	0	0	0
	本市	0	0	0	0	0

(備考)注意報は、光化学オキシダントの濃度が0.12ppm以上である大気の汚染の状態になり、気象条件からみてその状態が継続すると認められるときに発令されます。鎌倉市は湘南地域※に所属しており、湘南地域に所属するいずれかの市町にて上記の状態である時に「湘南地域に光化学スモッグ注意報発令」となります。

表中の「本市の発令日数」の欄には、鎌倉市本庁舎屋上にて測定している光化学オキシダント濃度の1時間値が0.12ppm以上となったの日数を記載しています。

※湘南地域：鎌倉市、平塚市、藤沢市、逗子市、茅ヶ崎市、葉山町、二宮町、寒川町、大磯町

(4) 自動車排出ガス等環境調査

本市では、自動車排出ガスによる大気汚染の状況を把握するため、二酸化窒素と浮遊粒子状物質等の調査を、市内主要道路の7地点で年2回実施しています。

ア 29年度月別調査結果

(i) 二酸化窒素 (NO₂) 測定結果(24時間平均値 単位 : ppm)

地 点	平成29年5月	11月	平均値
青少年会館	0.010	0.004	0.007
長谷	0.009	0.005	0.007
腰越	0.009	0.004	0.007
手広	0.014	0.009	0.012
大船	0.009	0.004	0.007
海岸橋	0.010	0.006	0.008
関谷	0.012	0.007	0.010
平均値	0.010	0.006	0.008

(ii) 浮遊粒子状物質 (SPM) 測定結果(24時間平均値 単位 : mg/m³)

地 点	平成29年5月	11月	平均値
青少年会館	0.020	0.010	0.015
長谷	0.024	0.010	0.017
腰越	0.021	0.012	0.017
手広	0.017	0.013	0.015
大船	0.024	0.009	0.017
海岸橋	0.023	0.015	0.019
関谷	0.019	0.011	0.015
平均値	0.021	0.011	0.016

(iii) 交通量測定結果(単位 : 台/12時間)


地 点	平成29年5月	11月	平均値
青少年会館	8,610	8,516	8,563
長谷	7,185	6,748	6,967
腰越	9,728	9,623	9,676
手広	23,563	22,433	22,998
大船	9,106	9,104	9,105
海岸橋	13,909	13,370	13,640
関谷	11,155	11,057	11,106
平均値	11,894	11,550	11,722

※交通量は12時間（8時～20時）連続計測したものです。ただし二輪車は観測の対象外としました。

青少年会館→鎌倉青少年会館前
 腰越→腰越行政センター前
 大船→大船警察署前
 関谷→鎌倉市立関谷小学校前

長谷→鎌倉消防団第25分団器具置場前
 手広→手広交差点前
 海岸橋→海岸橋交差点前

平成 29 年度 自動車排出ガス等環境調査地点図



(5) 二酸化窒素濃度調査

大気汚染の原因の代表物質である二酸化窒素による市内大気汚染状況を把握するため、P T I O法による大気中の二酸化窒素濃度を調査しています。

ア 調査期間

平成29年4月～平成30年3月

イ 調査場所

市内7地点

ウ 調査方法

P T I O法による大気中二酸化窒素濃度調査

調査地点の施設の屋上にシェルターを設置し、捕集用ろ紙を内装したサンプラーをそのシェルター内に取り付け、1ヵ月暴露した後サンプラーを回収し分析を行います。

エ 二酸化窒素濃度年平均値の経年変化（単位：v/vppm）

調査地点	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
鎌倉市役所(御成町18-10)	0.011	0.012	0.012	0.010	0.011
第二小学校(二階堂878)	0.014	0.011	0.011	0.0096	0.010
七里ガ浜浄化センター(七里ガ浜東5-3-1)	0.012	0.010	0.012	0.010	0.011
腰越行政センター(腰越864)	0.013	0.014	0.013	0.012	0.013
深沢行政センター(常盤111-3)	0.013	0.013	0.013	0.012	0.012
今泉小学校(今泉2-13-1)	0.012	0.012	0.012	0.010	0.011
関谷小学校(関谷468-1)	0.014	0.015	0.015	0.013	0.014
市内全地点平均値	0.013	0.012	0.013	0.011	0.012

オ 29年度二酸化窒素濃度の測定結果（単位：v/vppm）


調査月	鎌倉市役所	第二小学校	七里ガ浜浄化センター	腰越行政センター	深沢行政センター	今泉小学校	関谷小学校	月平均
29年4月	0.0097	0.0084	0.0098	0.012	< 0.005	0.011	0.011	0.0096
5月	0.0077	0.0079	0.0076	0.0087	0.0083	0.0074	0.010	0.0082
6月	0.0071	0.0061	0.0089	0.0078	0.0074	0.0081	0.010	0.0079
7月	< 0.007	< 0.007	< 0.007	0.0073	0.0074	< 0.007	< 0.007	0.0071
8月	0.0097	0.0099	0.0094	0.010	0.010	0.0091	0.010	0.0097
9月	0.0097	0.0098	0.0095	0.011	0.012	0.011	0.012	0.011
10月	< 0.007	< 0.007	< 0.007	0.0079	< 0.007	< 0.007	0.0080	0.0073
11月	0.016	0.014	0.015	0.018	0.017	0.016	0.020	0.017
12月	0.016	0.016	0.019	0.021	0.020	0.019	0.023	0.019
30年1月	0.013	0.012	0.013	0.017	0.019	0.016	0.021	0.016
2月	0.014	0.013	0.013	0.017	0.019	0.013	0.018	0.015
3月	0.013	0.013	0.011	0.014	0.016	0.011	0.017	0.014
年平均	0.011	0.010	0.011	0.013	0.012	0.011	0.014	0.012

※定量下限値は変動する。6、7月については0.007v/vppm 4、8月は0.005v/vppm

※月平均の算出には、測定値が定量下限値未満の場合、定量下限値を入力した。

ただし、4、8月については全地点定量下限地を下回ったため、月平均値を<0.005とした。

平成 29 年度 大気中二酸化窒素濃度調査結果図



(6) 酸性雨調査

鎌倉市では、市庁舎中庭（1階）にて水素イオン濃度計（pH計）を用いた簡易測定による酸性雨調査を行っています。29年度は延べ31回の測定を実施し、平均値は5.2で28年度より0.1高い値となりました。最も酸性の強い値は4.0で、28年度と同様に弱酸性の雨が観測されました。

また、年間を通して全体の約83.9%が酸性雨（水素イオン濃度（pH）5.6以下の雨）であり、弱酸性ではあるものの、やや酸性度の高い雨が今年度も何回か観測されており、酸性雨という地球環境問題が未だ解決されていないと考えられます。

ア 測定値

平均値	水素イオン濃度（pH）	5.2
最も酸性の強かった測定値	水素イオン濃度（pH）	4.0
最も酸性の弱かった測定値	水素イオン濃度（pH）	7.5

イ 経年水素イオン濃度（pH）測定結果

	26年度	27年度	28年度	29年度
市庁舎中庭	5.2	5.4	5.1	5.2

ウ 神奈川県による水素イオン濃度（pH）測定結果（かながわ環境白書より）

神奈川県では、環境省の「湿性沈着モニタリング手引書」に基づき、平成29年度は県内2市の協力を得て雨水を採取し、水素イオン濃度（pH）などを測定し、酸性雨の実態調査を行っています。

地点	26年度	27年度	28年度	29年度
川崎市川崎区	4.9	5.3	5.4	5.1
平塚市	5.1	5.1	5.1	5.1

※ 神奈川県の共同調査に係る水素イオン濃度（pH）の年間平均値は、雨水を1週間採取した際の期間降水量で重み付けをしています。

鎌倉市で行っている簡易測定データとは測定方法が異なるため単純に比較は出来ません。